

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

Edition
Grandes Cultures

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

BULLETIN TECHNIQUE N° 11

5 Mai 1994

- COLZA** : Surveiller encore le Charançon des siliques en situations tardives.
- BLE** : Protection fongicide.
- TOURNESOL, MAIS** : Surveiller les limaces.

*** COLZA *****STADES :**

En général compris entre G1 (début chute des pétales) et G3 (10 premières siliques à plus de 4 cm mais non encore bosselées). La fin de floraison commence à être observée.

RAVAGEURS :

Le Charançon des siliques reste à surveiller dans les situations peu avancées. Une reprise des arrivées a parfois été notée avec le beau temps. Une intervention de bordure peut être nécessaire.

MALADIES :

Aucune évolution particulière n'est à signaler. Seul l'*Alternaria*, non encore observé, sera à surveiller en cas de périodes orageuses répétées.

*** BLE *****STADES :**

Dans l'ensemble, de "2-3 noeuds" à "début gonflement" (quelques débuts d'éclatement de gaines sont notés sur Récital ou Gascogne semés en Octobre en situation précoce) ; "sortie à étalement de la dernière feuille" le plus souvent observé.

MALADIES :

La situation reste assez saine, essentiellement marquée par la **Septoriose**, qui reste pratiquement absente des 3 dernières feuilles. La simulation par le modèle CLEAN montre des contaminations en relation avec les pluies autour du 25 Avril. La sortie des taches correspondantes se traduira par une

remontée du risque qui demeure actuellement modéré. Les conditions météorologiques des prochaines semaines seront déterminantes.

La **Rouille brune** reste observée ponctuellement sous forme de quelques pustules sur F4 ou F3 (Ardentes -36-, Chanceaux -37-, Herbault -41-, Tigy, Vennecy -45-). Son évolution est susceptible de devenir plus rapide ; à surveiller.

Aucun foyer de **Rouille jaune** n'est signalé à ce jour dans la région Centre.

→ Pour les parcelles ayant reçu une protection postérieure au 15 Avril, la couverture fongicide reste en principe assurée -sauf produit peu persistant ou dose réduite- et on pourra normalement attendre l'épiaison pour réintervenir.

→ Pour les parcelles traitées avant le 15 Avril :

- si l'épiaison n'est pas attendue avant 10-15 jours, un traitement intermédiaire sera nécessaire,

- au cas où un produit persistant ait été utilisé et où l'épiaison soit assez proche, on pourra chercher à s'en rapprocher. Dans tous les cas, intervenir avant une période pluvieuse pour ne pas laisser la Septoriose ou la Rouille brune progresser et s'installer sur la 3^e feuille.

→ Pour les parcelles non encore protégées où l'on envisage une protection à un seul traitement, celui-ci devra (si la pression permet d'attendre cette période) intervenir au stade "dernière feuille-gonflement". De la même façon, ne pas laisser la Septoriose ou la Rouille brune progresser et s'installer sur la 3^e feuille.

La persistance d'un produit s'entend pour des applications à dose normale.

direction régionale de l'**agriculture** et de la **forêt**

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE
93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cédex
Tél. 38.86.36.24 - Fax 38.84.19.79

ABONNEMENT ANNUEL : 260 F

